

Les principaux médicaments remboursés à 15 % et leurs alternatives

Médicament	Indication	Conduite à tenir
Pneumologie-ORL		
Pneumorel [®] 80 mg, comprimés enrobés en boîte de 30 ; 0,2 %, sirop, 150 ml en flacon (laboratoires Servier). Principe actif : chrorydrate de fenspiride.	Toux et expectoration dans les bronchites.	Arrêt du tabac. Consultation médicale en cas de fièvre.
Surbronc [®] , 15 mg/2 ml, solution injectable, 2 ml en ampoule en boîte de 12 ; 30 mg/4 ml, solution injectable, 4 ml en ampoule en boîte de 12 (laboratoires Boehringer Ingelheim France). Principe actif : chlorydrate d'ambroxol).	Bronchites, pneumopathie. Mucoviscidose.	Arrêt du tabac. Consultation médicale qui peut aboutir à la prescription de paracétamol en cas de fièvre ou d'autres médicaments mieux adaptés. Votre médecin vous prescrira éventuellement une prise en charge par kinésithérapie de désencombrement ou oxygénothérapie... D'autres prises en charge plus efficaces existent.
Gomenoleo [®] , solution pour application locale, 2 %, 5 ml en ampoule en boîte de 10 et 5 %, 5 ml en ampoule en boîte de 10 (laboratoires du Goménol). Huile goménolée [®] , solution pour instillation nasale, 2 % et 5 %, 22 ml en flacon (laboratoires du Goménol). Principe actif : goménol.	Rhinites croûteuses post-opératoires ou post traumatiques.	Lavage du nez avec du sérum physiologique jusqu'à la fin de la cicatrisation.
Thiovalone [®] suspension pour pulvérisation buccale, 12 ml (66 doses) en flacon avec embout buccal (laboratoires Pfizer). Principe actif : pivalate de tixocortol, digluconate de chlorhexidine.	Angine Douleurs après ablation des amygdales (affection de l'oropharynx).	Consultation médicale pour déterminer l'origine de l'angine. Les angines d'origine virale guérissent spontanément. Les angines d'origine bactérienne sont traitées par antibiotiques. Le médecin peut ajouter du paracétamol ou des antalgiques en cas de fièvre. Soulagement des douleurs avec du paracétamol et/ou un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS).
Gastro-entérologie		
Ercéfuryl [®] 100 mg, gélules en boîte de 30 ; 200 mg en boîte de 28 (laboratoires Sanofi-Aventis OTC). Lumifurex [®] , 200 mg, gélules Gé en boîte de 28 (laboratoires Winthrop Médicaments) et autres génériques du principe actif nifuroxazide.	Diarrhée	Arrêt de la consommation de certains aliments : crudités, plats épicés, boissons glacées... Régime à base de riz et de carottes, avec suffisamment d'eau. En cas d'inconfort important, prise d'un ralentisseur de transit à base de lopéramide (Imodium [®] ou lopéramide en générique). Prévention et lutte contre la déshydratation chez les personnes fragiles, avec des solutés de réhydratation orale. Elimination des risques de contagion par un lavage fréquent des mains.
Genésérine [®] , 3 mg, gouttes, solution buvable, 30 ml en flacon ; 4,5 mg, comprimés en boîte de 30 (laboratoires Eisai SA). Principe actif : salicylate d'éséridine anhydre.	Digestion difficile (dyspepsie)	Consultation médicale pour rechercher les causes organiques. Arrêt de la consommation d'alcool, de caféine, l'aliments gras et de tabac.
Génatropine [®] , 0,15 %, solution buvable, 20 ml en flacon avec seringue doseuse ; 0,5 mg, comprimés en boîte de 60	Troubles fonctionnels digestifs	Application en premier lieu de mesures diététiques. Consultation médicale qui peut aboutir à un traitement éventuel par des

(laboratoires Eisai SA). Principe actif : chlorhydrate d'atropine n-oxyde.		médicaments spécifiques de la douleur, de la constipation ou de la diarrhée.
Cardiologie		
Praxinor [®] , comprimés pelliculés boîte de 20 (laboratoires Merck Liphà Santé SAS). Principe actif : théodrénaline, cafédrine	Chute de tension lors du passage à la station debout (hypotension orthostatique).	Ajustement par le médecin du traitement si le trouble est causé par un médicament. Modification des comportements : éviter l'alcool, adopter un régime normalement salé, surélever la tête du lit, porter des bas ou collants de contention.
Persantine [®] , 75 mg, comprimés enrobés en boîte de 30 (laboratoires Boehringer Ingelheim France). Cléridium [®] 150 mg, comprimés pelliculés sécables en boîte de 60 (laboratoires Dexo SA). Principe actif : dipyridamole	Prévention des accidents thrombo-emboliques. Traitement après pontage coronarien ou à la suite d'un infarctus du myocarde	Consultation médicale qui peut aboutir à la prescription d'un traitement mieux adapté.
Vasodilatateurs et nootropes		
Vadilex [®] , 20 mg comprimé en boîte de 30 ; 6 mg/2 ml, solution injectable en ampoule en boîte de 10 (laboratoires Sanofi Aventis). Principe actif : ifenprodil. Fonzilane [®] , 50 mg/5 ml, solution injectable en boîte de 12 (laboratoires Céphalon France). Principe actif : buflomédil. Iskédyl [®] , solution injectable en ampoule en boîte de 6 (Laboratoires Pierre Fabre Médicament). Principe actif : dihydroergocristine + raubasine Torental [®] , 100 mg, solution injectable en ampoule de 5 ml en boîte de 6 (laboratoires Sanofi Aventis). Principe actif : pentoxifylline Trivastal [®] , 3 mg/1 ml, solution injectable en ampoule en boîte de 2 (laboratoires Servier). Principe actif : piriépédil.	Traitement des troubles vasculaires : accident vasculaire cérébral, ischémie (diminution de l'apport sanguin) sévère des membres inférieurs, troubles visuels d'origine vasculaire <i>Cas particulier de l'arthéropathie oblitérante des membres inférieurs : les médicaments à base de naftidrofuryl et de buflomédil (Fonzylane[®] sous forme orale) ont un service médical rendu suffisant et resteront remboursés dans cette indication.</i>	Consultation médicale pour prise en charge des facteurs de risques vasculaires, revascularisation chirurgicale dans l'ischémie et traitement des causes de la maladie. Prescription éventuelle d'autres médicaments.
Proctologie		
Cirkan Prednacinolone [®] , suppositoires en boîte de 12 (laboratoires Pierre Fabre Médicament).	Douleurs des hémorroïdes.	Soulagement des douleurs : bains de siège à l'eau tiède, application de glaçons exerçant un effet anesthésiant sur la zone sensible. La prise en charge et la prévention reposent sur la lutte contre la constipation et le surpoids, ainsi que sur des changements de comportement : éviter l'alcool, les graisses, les épices, augmenter la consommation d'eau et d'aliments riches en fibres, pratiquer une activité physique.
Psychiatrie		
Covatine [®] 50 mg, comprimés enrobés (B/45) (laboratoires Bailly-Creat). Principe actif : chlorhydrate de captodiamine).	Anxiété	Dans l'anxiété mineure, mise en place de changements de comportement ou d'habitudes alimentaires : arrêt du tabac, diminution de la consommation d'alcool et d'excitants, régulation du sommeil, pratique de l'exercice physique et alimentation équilibrée. Ces mesures peuvent être complétées par une prise en charge psychologique.

Urologie		
Succinimide pharbiol® 3 g, poudre pour suspension buvable en sachets-doses en boîte de 30 (Société d'études et de recherches pharmaceutiques). Principe actif : succinimide.	Calculs rénaux (Lithiase rénale oxalique)	En l'absence d'élimination spontanée du calcul, le médecin spécialiste peut réaliser une intervention en milieu hospitalier (lithotritie extra corporelle). Prévention des récurrences par l'amélioration de la sécrétion d'urine ou diurèse : boire davantage d'eau, éviter certaines boissons et certains aliments.